


Lösung W1a/2004

Lösungslogik

Zur Beachtung: die Skizze zeigt den Diagonalschnitt, nicht den Parallelschnitt.
 Berechnung von $\frac{d}{2}$ über den $\sin\epsilon$ und daraus d .
 Berechnung von h_1 über den Satz des Pythagoras.
 Berechnung der Kantenlänge a der quadratischen Grundfläche über d .
 Berechnung von h_{S_1} über den Satz des Pythagoras.
 Berechnung von V_1 über die Volumenformel.
 Berechnung von V_2 .
 Berechnung von h_2 über die Volumenformel.
 Berechnung von h_{S_2} über den Satz des Pythagoras.
 Berechnung von M_1 und M_2 sowie $O_{\text{Körper}}$.



Klausuraufschrieb

$\frac{d}{2}$:	$\sin\epsilon = \frac{\frac{d}{2}}{s_1}$		$\cdot s_1$ Powered by GEOGEBRA.org
	$\frac{d}{2} = s_1 \cdot \sin\epsilon = 12,4 \cdot \sin 52,8^\circ = 9,88$		
d :	$d = 2 \cdot \frac{d}{2} = 2 \cdot 9,88 = 19,76$		
h_1 :	$h_1 = \sqrt{s_1^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \sqrt{12,4^2 - 9,88^2}$		Satz des Pythagoras
	$h_1 = \sqrt{56,1456} = 7,5$		
a :	$d = a \cdot \sqrt{2}$		$:\sqrt{2}$
	$a = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{19,76}{\sqrt{2}} = 13,97$		
$\frac{a}{2}$:	$\frac{a}{2} = 0,5 \cdot a = 7,0$		
h_{S_1} :	$h_{S_1} = \sqrt{s_1^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{12,4^2 - 7,0^2}$		Satz des Pythagoras
	$h_{S_1} = \sqrt{104,76} = 10,24$		
V_1 :	$V_1 = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h_1 = \frac{1}{3} \cdot 13,97^2 \cdot 7,5 = 487,9$		
V_2 :	$V_2 = 2 \cdot V_1 = 2 \cdot 487,9 = 975,8$		
h_2 :	$V_2 = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h_2$		$\cdot 3; : a^2$
	$h_2 = \frac{3 \cdot V_2}{a^2} = \frac{3 \cdot 975,8}{13,97^2} = 15,0$		
h_{S_2} :	$h_{S_2} = \sqrt{h_2^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{15,0^2 + 7,0^2}$		Satz des Pythagoras
	$h_{S_2} = \sqrt{274} = 16,55$		
M_1 :	$M_1 = 2 \cdot a \cdot h_{S_1} = 2 \cdot 13,97 \cdot 10,24 = 286,10$		
M_2 :	$M_2 = 2 \cdot a \cdot h_{S_2} = 2 \cdot 13,97 \cdot 16,55 = 462,40$		
O_{Ges} :	$O_{\text{Ges}} = M_1 + M_2 = 286,10 + 462,40 = 748,5$		

Die Oberfläche des zusammengesetzten Körpers beträgt 748,5 cm².

Lösung Aufgabe W1b/2004

Lösungslogik


Die Skizze zeigt das Schrägbild des gegebenen Würfels.

Die Strecke \overline{AB} ist die Raumdiagonale im Würfel. Der Winkel γ ist dadurch 45° .

Im Dreieck ABC ist die Strecke \overline{AD} als Flächendiagonale der Grundfläche gleichzeitig Höhe auf die Seite BC .

Berechnung der Dreiecksfläche über die Flächenformel des Dreiecks.

Berechnung von \overline{AC} über den Satz des Pythagoras.



Klausuraufschrieb

$$\overline{AD}: \quad \overline{AD} = a \cdot \sqrt{2}$$

| Flächendiagonale

$$A_{ABC}: \quad A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AD}$$

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} a \cdot a \cdot \sqrt{2} = \frac{3}{8} a^2 \sqrt{2}$$

q.e.d.

$$\overline{AC}: \quad \overline{AC} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{CD}^2} = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + \left(\frac{1}{4}a\right)^2}$$

| Satz des Pythagoras

$$\overline{AC} = \sqrt{2a^2 + \frac{1}{16}a^2} = \sqrt{\frac{33}{16}a^2} = \frac{a}{4}\sqrt{33}$$

Lösung W2a/2004

Lösungslogik

Umstellung der Parabelgleichung p_1 in die Scheitelpunktgleichung.

Bestimmung des Scheitelpunkts von p_2 aus der Aufgabenstellung.

Bestimmung des Schnittpunkts Q von p_1 mit p_2 durch Gleichsetzen.

Aufstellen der Geradengleichung g durch S_2 und Q .

Aufstellen der zu g parallelen Geradengleichung h durch S_1 .

Klausuraufschrieb

$$p_1: \quad y = x^2 + 4x + 6$$

Scheitelpunkt von p_1 :

$$y = (x + 2)^2 + 2$$

| quadratische Ergänzung

$$S_1(-2|2)$$

Scheitelpunktverschiebung gem. Aufgabenstellung:

$$S_2: \quad S_2(-2 + 3|2 - 3)$$

$$S_2(1|-1)$$

Funktionsgleichung von p_2 :

$$p_2: \quad y = (x - 1)^2 - 1$$

| Scheitelpunktgleichung p_2

$$y = x^2 - 2x$$

Lösung W3a/2004


Lösungslogik (einfach)

Berechnung von \overline{EC} über $\cos\gamma$.

Berechnung von α .

Berechnung von \overline{BD} mit dem Kosinussatz.

Berechnung von A_{ABDE} aus der Summe von \overline{EC}^2 und A_{ECD} abzüglich A_{BCD} .



Klausuraufschrieb

$$\overline{BD}: \quad \overline{BD} = \sqrt{\overline{CD}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \cdot \overline{CD} \cdot \overline{BC} \cdot \cos\alpha} \quad | \quad \text{Kosinussatz}$$

$$\overline{EC}: \quad \cos\gamma = \frac{\overline{CD}}{\overline{EC}} \quad | \quad \cdot \overline{EC}; : \cos\gamma$$

$$\overline{EC} = \frac{\overline{CD}}{\cos\gamma} = \frac{4,1}{\cos 33,4^\circ} = 4,91$$

$$\overline{BC}: \quad \overline{BC} = \overline{EC} = 4,91$$

$$\alpha: \quad \alpha = 90^\circ + \gamma = 90^\circ + 33,4^\circ = 123,4^\circ$$

$$\overline{BD} = \sqrt{4,1^2 + 4,91^2 - 2 \cdot 4,1 \cdot 4,91 \cdot \cos 123,4^\circ} = 7,94$$

$$A_{ABDE}: \quad A_{ABDE} = A_{ABCD} + A_{ECD} - A_{BCD}$$

$$A_{ABCD}: \quad A_{ABCD} = \overline{EC}^2 = 4,91^2 = 24,11 \text{ cm}^2$$

$$A_{ECD}: \quad A_{ECD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{EC} \cdot \overline{CD} \cdot \sin\gamma \quad | \quad \text{trigonometrischer Flächeninhalt}$$

$$A_{ECD} = \frac{1}{2} \cdot 4,91 \cdot 4,1 \cdot \sin 33,4^\circ = 5,54 \text{ cm}^2$$

$$A_{BCD}: \quad A_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{EC} \cdot \overline{CD} \cdot \sin\alpha \quad | \quad \text{trigonometrischer Flächeninhalt.}$$

$$A_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 4,91 \cdot 4,1 \cdot \sin 123,4^\circ = 8,40 \text{ cm}^2$$

$$A_{ABDE}: \quad A_{ABDE} = 24,11 + 5,54 - 8,40 = 21,25 \text{ cm}^2$$

Die Strecke \overline{BD} ist 7,9 cm lang. Die Fläche des Vierecks ABDE beträgt 21,3 cm².

Lösungslogik (umständlich)

Berechnung von $\overline{EC} = \overline{AB}$ über den $\cos\gamma$.


Berechnung von \overline{FD} über den $\sin\gamma$.

Berechnung von \overline{EF} über den $\tan\gamma$.

Berechnung von \overline{FC} aus Differenz von \overline{EC} und \overline{EF} .

Die rote Fläche lässt sich jetzt berechnen aus:
Fläche Rechteck AGFE + Fläche Dreieck EFD + Fläche Dreieck BDG.

Berechnung der Strecke \overline{BD} über den Satz des Pythagoras.



Klausuraufschrieb

$$\overline{EC}: \quad \cos\gamma = \frac{\overline{CD}}{\overline{EC}} \quad | \quad \cdot \overline{EC}; : \cos\gamma$$

$$\overline{EC} = \frac{\overline{CD}}{\cos\gamma} = \frac{4,1}{\cos 33,4^\circ} = 4,91$$

$$\overline{FD}: \quad \sin\gamma = \frac{\overline{FD}}{\overline{CD}} \quad | \quad \cdot \overline{CD}$$

$$\overline{FD} = \overline{CD} \cdot \sin\gamma = 4,1 \cdot \sin 33,4^\circ = 2,257$$

$$\overline{EF}: \quad \tan \alpha = \frac{\overline{EF}}{\overline{FD}} \quad | \quad \cdot \overline{FD}; : \tan \alpha$$

$$\overline{EF} = \frac{\overline{FD}}{\tan \alpha} = \frac{2,257}{\tan 33,4^\circ} = 3,423$$

$$\overline{FC}: \quad \overline{FC} = \overline{EC} - \overline{EF} = 4,91 - 3,423 = 1,487$$

$$A_{ABDE}: \quad A_{ABDE} = A_{AGFE} + A_{EFD} + A_{BDG}$$

$$A_{AGFE}: \quad A_{AGFE} = \overline{EF} \cdot \overline{AB} = 1,4882 \cdot 4,91 = 7,307$$

$$A_{EFD}: \quad A_{EFD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{EF} \cdot \overline{FD} = \frac{1}{2} \cdot 1,4882 \cdot 2,257 = 1,6794$$

$$A_{BDG}: \quad A_{BDG} = \frac{1}{2} \cdot \overline{FC} \cdot (\overline{AB} + \overline{FD}) = \frac{1}{2} \cdot 3,423 \cdot (4,91 + 2,257) = 12,2663$$

$$A_{ABDE}: \quad A_{ABDE} = 7,307 + 1,6794 + 12,2663 = 21,2527$$

$$\overline{BD}: \quad \overline{BD} = \sqrt{\overline{FC}^2 + (\overline{AB} + \overline{FD})^2} \quad | \quad \text{Satz des Pythagoras}$$

$$\overline{BD} = \sqrt{3,423^2 + (4,9112 + 2,0257)^2} = 7,9435$$

Die Strecke \overline{BD} ist 7,9 cm lang. Die Fläche des Vierecks ABDE beträgt 21,3 cm².

Lösung W3b/2004

Lösungslogik

Die Fläche des Vierecks A_{ASED} errechnet sich aus der Fläche des Dreiecks A_{ACD} abzüglich der Fläche des Dreiecks A_{ESC} .

Berechnung von \overline{DC} über den $\tan 30^\circ$.


Bestimmung von \overline{SC} über den $\sin 30^\circ$.

Berechnung von \overline{SE} über den $\tan 30^\circ$.

Berechnung von A_{ACD} über die Flächenformel des Dreiecks.

Berechnung von A_{ESC} über die Flächenformel des Dreiecks.

Berechnung von A_{ASED} und Vereinfachen.



Klausuraufschrieb

$$A_{ASED} = A_{ACD} - A_{ESC}$$

$$\overline{DC}: \quad \tan 30^\circ = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}} \quad | \quad \cdot \overline{DC}; : \tan 30^\circ$$

$$\overline{DC} = \frac{\overline{AD}}{\tan 30^\circ} = \frac{2e}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{6e}{\sqrt{3}}$$

$$\overline{SC}: \quad \sin 30^\circ = \frac{\overline{SC}}{\overline{BC}} \quad | \quad \cdot \overline{BC}$$

$$\overline{SC} = \overline{BC} \cdot \sin 30^\circ = 2e \cdot 0,5 = e$$

$$\overline{SE}: \quad \tan 30^\circ = \frac{\overline{SE}}{\overline{SC}} \quad | \quad \cdot \overline{SC}$$

$$\overline{SE} = \overline{SC} \cdot \tan 30^\circ = e \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{e\sqrt{3}}{3}$$

$$A_{ACD}: \quad A_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{DC} = \frac{1}{2} \cdot 2e \cdot \frac{6e}{\sqrt{3}} = \frac{6e^2}{\sqrt{3}}$$

$$A_{ESC}: \quad A_{ESC} = \frac{1}{2} \cdot \overline{SC} \cdot \overline{SE} = \frac{1}{2} \cdot e \cdot \frac{e\sqrt{3}}{3} = \frac{e^2\sqrt{3}}{6}$$

$$A_{ASED}: \quad A_{ASED} = \frac{6e^2}{\sqrt{3}} - \frac{e^2\sqrt{3}}{6} = \frac{36e^2 - e^2\sqrt{3}\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{36e^2 - 3e^2}{6\sqrt{3}}$$

$$= \frac{33e^2}{6\sqrt{3}} \quad | \quad \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$A_{ASED} = \frac{33e^2 \cdot \sqrt{3}}{6 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{33e^2 \cdot \sqrt{3}}{6 \cdot 3} = \frac{11}{6} e^2 \sqrt{3} \quad \mathbf{q.e.d.}$$

Lösung W4a/2004

Klausuraufschrieb

- (a) gehört zur Gleichung (4)
Nach oben geöffnete Normalparabel
mit Scheitelpunkt $S(-4|-3)$
- (b) gehört zur Gleichung (12)
Gerade mit negativer Steigung $m = -\frac{1}{5}$
und y -Achsenabschnitt $S_y(0|3)$.
- (c) gehört zur Gleichung (9)
Gerade mit negativer Steigung $m = -3$
und y -Achsenabschnitt $S_y(0|2)$.
- (d) gehört zur Gleichung (7)
Nach oben geöffnete Normalparabel
mit Verschiebung nach rechts und nach
oben, $S(2|1)$.
- (e) gehört zur Gleichung (1)
Nach unten geöffnete und gestauchte Parabel mit Scheitelpunkt $S(0|3)$

