Lösung A1

a) $g = f'$
Begründung: Hochpunkt von f in $x_0 = -1$ führt zur Nullstelle von g mit Vorzeichenwechsel von "$+$" nach "$-$".

b) $g = f'$
Begründung: Hochpunkt von f in $x_0 = -2{,}5$ führt zur Nullstelle von g mit Vorzeichenwechsel von "$+$" nach "$-$". Tiefpunkt in $x_0 = 1$ führt zur Nullstelle von g mit Vorzeichenwechsel von "$-$" nach "$+$".

c) $g = f'$
Begründung: f hat in ganz $x \in \mathbb{R}$ negative Steigung, also muss g in ganz $x \in \mathbb{R}$ unterhalb der x-Achse verlaufen.

d) $g \neq f'$
Begründung: Tiefpunkt von f in $x_0 = 0$ führt nicht zur Nullstelle von g.

e) $g = f'$
Begründung: Tiefpunkt von f in $x_0 = -2$ führt zur Nullstelle von g mit Vorzeichenwechsel von "$-$" nach "$+$".

f) $g \neq f'$
Begründung: Hochpunkt von f in $x_0 = -3{,}5$ sowie Tiefpunkt von f in $x_0 = -0{,}5$ führen nicht zu Nullstellen von g.

g) $g = f'$
Begründung: f hat in ganz $x \in \mathbb{R}$ konstante, negative Steigung, also muss g in ganz $x \in \mathbb{R}$ parallel zur x-Achse und unterhalb der x-Achse verlaufen.

h) $g = f'$
Begründung: f hat für $x < 0$ negative und für $x > 0$ positive Steigung, also muss g für $x < 0$ unterhalb der x-Achse und für $x > 0$ oberhalb der x-Achse verlaufen.

Lösung A2

(1) $f'(1) = 2$ gehört zur Grafik C)
(2) $f'(1) = -2$ gehört zur Grafik D)
(3) $f'(1) = 0{,}5$ gehört zur Grafik B)
(1) $f'(1) = 0$ gehört zur Grafik A)

© by Fit-in-Mathe-Online, mehr als 500.000 Aufgaben für Schule und Studium
www.fit-in-mathe-online.de
Dr.-Ing. Meinolf Müller / webmaster@fit-in-mathe-online.de

Lösung A3

a) $f'(2) = 1$
$f'(-1) = -2$
$f'(-2) = -10$

b) $f'(0)$, $f'(0{,}5)$ und $f'(2{,}25)$ sind positiv.
$f'(-1{,}75)$ ist negativ

c) $f'(0{,}5) = 3$



Lösung A4

a) $f'(2) = 1$
$f'(-1) = -2$

b) $f'(3) = 2$
$f'(1) = 0$



© by Fit-in-Mathe-Online, mehr als 500.000 Aufgaben für Schule und Studium
www.fit-in-mathe-online.de
Dr.-Ing. Meinolf Müller / webmaster@fit-in-mathe-online.de